



ESCUELA DE MEDICINA LEGAL Y FORENSE

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de Medicina
Pabellón VII - 3ª planta
Pza. Ramón y Cajal, s/n
28040 Madrid

Tlfo.: 91 394 15 75

Fax: 91 394 16 06

E-mail: mtreyelv@med.ucm.es

mastoideo. Se observan también tres finos pliegues, que se extienden trasversales, con una anchura de entre 0,7-0,9 cm.

En el lado derecho el pliegue se extiende algo más que en el izquierdo y es algo más ancho (1 cm) y profundo y en el borde superior se palpa debido a flexión del cuello.

Plano posterior del cuello. Se encuentra un pliegue ancho (1,5 cm) horizontal, que continua hacia delante con marcas trasversales con un ancho, a veces considerable (5,5 cm). Se encuentra este surco a una distancia de 8 cm del inion. El surco superior termina en el ángulo mandibular.

En el lado derecho se observa una banda ancha con pliegues trasversales de una anchura de entre 1,5 y 2 cm. El borde inferior es más pronunciado.

Descripcion del torax y extremidad superior.

En el hombro izquierdo en su parte posterior se encuentra un corte de 2,5 cm y fondo ciego.

En la cara anterior del mismo hombro y en su tercio proximal se encuentra un agujero con medidas de 2,5 x 1,5 cm con trayecto biselado de abajo-arriba. Se comprueba con sonda una profundidad de 4,8 cm. La entrada en la piel tiene una inclinación de unos 15°, que se transforman en 45° cuando se llega a hueso, donde pueden observarse las esquirlas.

En la palma de la mano derecha se encuentra un agujero de entrada de disparo por arma de fuego de una dimensión de 2 x 3 cm, con infiltrado circular y con un área rojiza central. Agujero de salida de disparo en cara dorsal de la mano justo en la articulación carpo-

